

**Когда мы теряем ребёнка из-за болезни или несчастного случая - это огромное горе, но когда подросток сам прерывает свой жизненный путь - это непоправимая трагедия**

**Суицид** - умышленное самоповреждение со смертельным исходом (лишение себя жизни).

**Суицидальное поведение** - это проявление суицидальной активности через мысли, намерения, высказывания, угрозы, попытки, покушения.

### **1. Основные причины подростковых самоубийств:**

- проблемы и конфликты в семье, в образовательном учреждении;
- насилие в семье, в образовательном учреждении;
- несчастная любовь;
- подражание кумирам;
- чувство солидарности с группой;
- потеря родственников и близких.



### **2. Типичные ошибки и заблуждения, бытующие среди взрослых, которые затрудняют профилактику подростковых самоубийств:**

- самоубийства совершаются в основном психически неуравновешенными людьми;
- самоубийства предупредить невозможно, поскольку тот, кто решил покончить с собой, рано или поздно это сделает;
- если человек открыто заявляет о желании покончить с собой, то он никогда не совершил самоубийства;
- если загрузить человека работой, то ему некогда думать о самоубийстве;
- чужая душа – потемки, и поэтому предвидеть попытку самоубийства невозможно;
- существует некий тип людей, склонных к самоубийству;
- не существует признаков, которые указывали бы на то, что человек решился на самоубийство;
- решение о самоубийстве приходит внезапно, без предварительной подготовки.

### **3. Признаки, свидетельствующие о возможности подросткового суицида:**

- перемены в поведении, уединение, рискованное поведение;
- проблемы в учёбе, падение успеваемости, эмоциональные взрывы, засыпание на уроках;
- депрессия, изменения в питании и времени сна, усиление чувства беспокойства и безнадежности;
- чувство вины, потеря интереса к общественной жизни;

- устные заявления: «Я желаю быть мёртвым», «Оставь меня в покое»;

- излишнее проявление интереса к теме смерти, усиленное внимание к оккультизму;

- зывающая одежда;
- предыдущая суициdalная попытка;
- признаки жесткого физического или психологического обращения;
- употребление, а впоследствии злоупотребление алкоголем;
- беременность;
- наличие среди знакомых тех, кто ранее практиковал суицид.

### **4. Признаки готовящегося подросткового самоубийства:**

- приведение своих дел, жилья в порядок, раздача личных ценных вещей, хотя ранее человек мог быть неряшливым, неаккуратным;

- прощание, которое может принять форму благодарности различным людям за помочь в разное время;

- внешняя удовлетворённость, проявляющаяся в приливе энергии, связанная с тем, что, если решение покончить с собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают мучить подростка;

- письменные указания (в письмах, записках, дневнике);

- словесные указания или угрозы;

- вспышки гнева у импульсивных подростков;

- уход из дома;
- бессонница.

## **5. Что можно сделать для того, чтобы помочь подростку:**

- примите суицидента как личность;
- установите заботливые взаимоотношения;
- не спорьте;
- будьте внимательным слушателем;
- задавайте вопросы, получите как можно больше информации о самом ребенке, его жизни и проблемах;
- не предлагайте неоправданных утешений («Все будет хорошо», «Все пройдет»);
- предложите конструктивные подходы к решению проблемы;
- вселяйте надежду, опирайтесь на имеющиеся у ребенка мечты, желания, приятные воспоминания;
- оцените степень риска самоубийства;
- не оставляйте подростка одного в ситуации высокого суициdalного риска;
- обратитесь за помощью к специалистам.

## **6. Первая помощь подростку при суициде:**

Если Вы стали свидетелем суициdalной попытки:

1. Необходимо вызвать скорую помощь по телефону: 103 (03) – единый номер скорой помощи для абонентов мобильной связи, независимо от оператора.

2. Оказать первую доврачебную помощь подручными средствами:

- остановить кровотечение;
- при повешении освободить из петли и уложить на ровную поверхность;
- проверить наличие пульса;

**- при отравлении лекарственными средствами вызвать рвоту, если человек в сознании!**

**- при бессознательном состоянии следить за проходимостью дыхательных путей и повернуть голову набок так, чтобы не запал язык;**

**- если пострадавший находится в сознании, то необходимо поддерживать с ним постоянный!!! контакт, не оставляя его одного!!!**

**Самоубийство подростка часто бывает полной неожиданностью для окружающих.**

**Помните, подростки решаются на это внезапно!**

**Будьте внимательны к подросткам!**

### **Телефоны экстренной помощи:**

**8-800-2000-122** – детский телефон доверия с единым общероссийским номером;

**8-8342-38-01-50** – телефон доверия;

**8-8342-47-06-05** - молодежный телефон доверия;

**112, 123** - телефоны экстренной службы.

Все службы работают анонимно и бесплатно.

## **Памятка**

# **«Как предотвратить детско-подростковый суицид»**

